



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60  
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

**1. Название:** АКВАФЛОР

Рег.номер: РК-ВП-4-1838-12

Раствор для перорального применения

**2. Состав:**

Флорфеникол ..... 100 мг

Гвайфенезин ..... 25 мг

Наполнитель ..... до 1 мл

**3. Вид животного и показания к применению:**

Аквафлор применяют с лечебной целью **сельскохозяйственной птице** и **свиньям** при желудочно-кишечных, респираторных и кожных заболеваниях, вызываемых микроорганизмами, возбудители которых чувствительны к флорфениколу. Рекомендуется применять для лечения **свиней** при острых вспышках респираторных заболеваний, вызываемых чувствительными штаммами *Actinobacillus pleuropneumoniae* и *Pasteurella multocida*.

**4. Противопоказания:**

Не использовать курам-несушкам и супоросным свиноматкам.

Не использовать для животных с печеночной и почечной недостаточностью, страдающим заболеваниями сердца, а также с индивидуальной чувствительностью к активным веществам лекарственного средства.

Не использовать животным до 6-ти недельного возраста

**5. Дозировка и способ введения:**

Применяют с водой для поения индивидуально или групповым способом в дозе 1 мл Аквафлора / 1 литр питьевой воды / в день (соответствует 20 мг флорфеникола / на 1 кг



массы животного / в день). Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 24 часов. Во время лечения свиньи и птица должны получать только воду, содержащую Аквафлор.

#### **6. Период ожидания:**

Убой животных, в том числе птицы, на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после последнего применения Аквафлора. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

#### **7. Предосторожности при применении препарата:**

Необходимо учитывать, что гвайфенезин усиливает действие обезболивающих препаратов.

При повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам лекарственного препарата и появлении побочных явлений (отказ от корма, нарушение координации) его использование прекращают.

#### **8. Меры личной профилактики.**

При работе с Аквафлором следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Аквафлором. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

**9. Условия и сроки хранения:** при соблюдении условий хранения Аквафлора - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата 2 года с даты производства.

**10. Упаковка:** полимерные бутылки (1 литр) и полимерные канистры (5 литров) с навинчиваемыми крышками.