



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: НЕОКОЛИСТИН

Рег.номер: РК-ВП-4-1704-11

Водорастворимый порошок

2. Состав:

Колистин 30 000 000 МЕ
Неомицин 6 г
Тилозин 2,5 г
Витамин А 450 000 МЕ
Витамин С 2,5 г
Дипирон 1 г
Преднизалон 1 мг
Наполнитель до 100 г

3. Вид животного и показания к применению:

Неоколистин назначают **сельскохозяйственной птице** с лечебной и лечебно-профилактической целью при респираторных заболеваниях, в частности, при хроническом респираторном заболевании, колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к компонентам лекарственного средства.

4. Противопоказания:

Не применять птице у которой наблюдается обезвоживание организма, почечная недостаточность и угнетенное дыхание. При повышенной индивидуальной чувствительности птицы к компонентам лекарственного средства и появлении побочных явлений (отказ от корма, нарушение координации).

5. Дозировка и способ введения:

Лекарственное средство применяют курам и индейкам орально в течение 4-6 суток с водой для поения в дозе 1-2 г на литр воды.



В период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственное средство. Лечебный раствор Неоколистина готовят ежедневно в расчете на потребление птицей в течение суток.

6. Период ожидания:

Убой кур на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток, индеек – 5 суток после последнего применения Неоколистина. Мясо птицы, вынужденно убитой до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Не применять вместе с бактериостатиками (тетрациклины, хлорамфениколь, сульфамиды) другими аминогликозидами, нервно-мышечными блокаторами, общими анестетиками или антидиуретиками.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Неоколистином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Неоколистином. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности Неоколистина составляет 3 года со дня производства.

10. Упаковка: герметичные пакеты из ламинированной фольги по 1 кг и 5 кг.