



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ЛИНКО-ФУД 15% Рег.номер: РК-ВП-4-1975-12

Микрогранулированный порошок для перорального применения

2. Состав:

Линкомицина (гидрохлорид) 15 г

Наполнитель до 100 г

3. Вид животного и показания к применению:

Линко-фуд 15% применяют для лечения и профилактики дизентерии и микоплазменной пневмонии у **свиней** и для лечения некротического энтерита, вызванного *Clostridium perfringens* у **сельскохозяйственной птицы**, а также других инфекций, возбудители которых чувствительны к линкомицину.

4. Противопоказания:

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к линкомицину.

5. Дозировка и способ введения:

Линко-фуд 15% применяют животным в смеси с кормом:

Свиньи - профилактика дизентерии свиней: 300 г / т корма; лечение – 750 г / т корма, в течение 3-х недель; лечение микоплазменной пневмонии свиней – 1500 г / т корма, в течение трех недель.

Птица - профилактика и лечение некротического энтерита, вызванного *Clostridium perfringens*: 200-400 г/т корма в течении 7 дней.

В период лечения свиньи и птица должны получать только корм, содержащий препарат.



Линко-фуд вводят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств путем смешивания с зерновой частью, используя существующие технологии смешивания.

6. Период ожидания:

Убой **птицы** на мясо разрешается не ранее, чем через 1 сутки, **свиней** - не ранее, чем через 3-е суток после последнего применения препарата Линко-фуд 15%. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Побочных явлений и осложнений при применении Линко-фуда 15% в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Запрещается применение Линко-фуда 15% одновременно с эритромицином, а также курам-несушкам, яйца которых предназначаются в пищу людям.

8. Меры личной профилактики

При работе с Линко-фудом 15% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Линко-фудом 15%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Линко-фуда 15% - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата составляет 2 года со дня производства. После первого вскрытия мешка лекарственный препарат можно использовать в течение 90 суток.

10. Упаковка: полиэтиленовые пакеты и мешки 25 кг, ламинированные алюминиевой фольгой.