



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: АКВАДОКС

Рег.номер: РК-ВП-4-2135-12

Порошок для перорального применения

2. Состав:

Доксициклина (гиклат) 500 мг

Наполнитель до 1 г

3. Вид животного и показания к применению:

Аквадокс применяют с лечебно-профилактической целью **свиньям и цыплятам-бройлерам** при заболеваниях микоплазменной и бактериальной этиологии, а также **телятам-молочникам** при хронических респираторных заболеваниях, пастереллезе, колибактериозе, и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

4. Противопоказания:

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

5. Дозировка и способ введения:

Аквадокс применяют животным в смеси с питьевой водой или молоком в следующих дозах:

свиньи: 200 г Аквадокса на 1000 л питьевой воды (соответствует 10 мг доксициклина на 1 кг живой массы в день), в течение 5 суток

цыплята-бройлеры: 200 г Аквадокса на 1000 л питьевой воды (соответствует 15 мг доксициклина на 1 кг живой массы в день), в течение 3 – 5 суток

телята-молочники: 0,2 г Аквадокса на 10 кг живой массы в день (соответствует 10 мг доксициклина на 1 кг живой массы в день), в течение 5 суток задавать в смеси с подогретым до 37°C молоком.

6. Период ожидания:



Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток; цыплят-бройлеров - не ранее, чем через 7 суток; телят-молочников – не ранее, чем через 7 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, в том числе птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Запрещается применение Аквадокса совместно с антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп и препаратами кальция, ввиду возможного снижения антибактериальной активности лекарственного препарата, а также курам-несушкам и ремонтному молодняку кур с 16-недельного возраста, в связи с накоплением доксициклика в яйцах.

8. Меры личной профилактики:

При работе с Аквадоксом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Аквадоксом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25⁰С - срок годности лекарственного препарата 2 года со дня производства.

После первого вскрытия пакета лекарственный препарат можно использовать в течение 30 суток; после растворения в питьевой воде – 12 часов, в молоке – 60 минут.

10. Упаковка: полиэтиленовые пакеты, ламинированные алюминиевой фольгой вместимостью, по 1 кг.