



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60  
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

**1. Название:** АМОКСИ-50

Рег.номер: РК-ВП-4-1888-12

Водорастворимый порошок

**2. Состав:**

Амоксициллина (тригидрат) ..... 500 мг

Наполнитель ..... до 1 г

**3. Вид животного и показания к применению:**

Амокси-50 применяют при лечении инфекций желудочно-кишечного тракта, дыхательных и мочеполовых путей. Лечение осложнений, вызванных бактериями, чувствительными к амоксициллину. Препарат активен против следующих видов бактерий: грамположительные: *Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelotrix rhusiopathiae.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Listeria spp.*; грамотрицательные: *Actinobacillus spp.*, *Bordatella bronchiseptica*, *Brucella spp.*, *E.coli*, *Fusobacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus mirabais*, *Salmolonella spp.*, *Campylobacter spp.*

У **свиней** препарат используют для лечения и профилактики инфекционных процессов, вызванных *Streptococcus suis*, за исключением нервных и суставных форм проявления; у **птицы и телят-молочников** пастереллеза и колибактериоза, вызванными чувствительными к амоксициклину возбудителями, а также сальмонеллеза.

**4. Противопоказания:**

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к амоксициллину.

**5. Дозировка и способ введения:**

Амокси-50 применяют перорально с водой для поения в дозе 15 мг амоксициллина / кг массы тела животного каждые 24 часа в течение 5 дней.



Разведение продукта в воде необходимо делать из расчета потребляемой воды в течение суток и общего веса животных, которым задается медикамент. Раствор препарата готовят ежедневно. Расчет количества Амокси-50, которое нужно добавить в танк с водой:

$$\frac{\text{Кол-во животных} \times \text{Живая масса (кг)} \times \text{Доза (15 мг амоксицилина/кг ж.м./день)} \times \text{Объем воды в танке (л)}}{\text{Общее потребление воды в корпусе в течение предыдущего дня (л)} \times 500}$$

## **6. Период ожидания:**

Убой свиней и телят на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток; цыплят - 1 сутки; индюков - 5 суток; уток - 7 суток после последнего применения Амокси-50. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

## **7. Предосторожности при применении препарата:**

Амокси-50 проявляет антагонизм к препаратам тетрациклинового ряда и макролидам, поэтому следует избегать комбинаций этих препаратов.

Запрещается применение препарата курам-несушкам в связи с выделением амоксициллина с яйцами и кроликам.

## **8. Меры личной профилактики.**

При работе с Амокси-50 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Амокси-50. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

**9. Условия и сроки хранения:** при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых

солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата 2 года со дня производства. Приготовленный раствор использовать в течение 24 часов.



**10. Упаковка:** герметичные пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.