



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: КВИНОКОЛ ПЛЮС

Рег.номер: 724-2-1.8-2516 №ПВИ-2-1.8/02340

Раствор для инъекций

2. Состав:

Энрофлоксацин 65 мг

Гентамицина сульфат 30 мг

Наполнитель до 1 мл

3. Вид животного и показания к применению:

Свиньи: бактериальный энтерит, колибактериоз (колидизентерия), колиэнтеротоксемия (отечная болезнь), сальмонеллез, синдром ММА (мастит-метрит-агалактия) и плевропневмония.

Крупный рогатый скот, овцы и козы: бактериальный энтерит, колибактериоз, колисептицемия, сальмонеллез, респираторные заболевания и пастереллез

А также при заболеваниях, возбудители которых, чувствительны к комбинации действующих веществ препарата.

4. Противопоказания:

Запрещается применять новорожденным животным, животным с почечной и печеночной недостаточностью, при заболеваниях нервной системы, сопровождающихся судорогами, в случае индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

5. Дозировка и способ введения:

Квинокол Плюс применяют один раз в сутки в дозе 0,5 мл / 10 кг массы животного.

Свиньи: внутримышечно в течение 3-7 дней; свиноматкам при синдроме ММА (метрит-мастит-агалактия) в течение 1-2 дней.

Овцам, козам, телятам: подкожно в течение 3-5 дней

Для всех видов животных, в случае остропротекающих заболеваний и сальмонеллезе, может быть рекомендована двойная доза.



6. Период ожидания:

Убой телят, овец, коз на мясо разрешается не ранее, чем через 60 суток, свиней – не ранее, чем через 40 суток после последнего применения Квинокола Плюс. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место инъекции овцам, телятам и свиньям более 5 мл, пороссятам - более 2,5 мл лекарственного препарата. После введения препарата рекомендуется массировать место инъекции.

Не рекомендуется применение Квинокола Плюс одновременно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, макролидами, тетрациклинами, сульфаниламидами) ввиду возможного антагонистического эффекта, теофилином, полиэфирными ионофорами, нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и кальция, нефротическими соединениями.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Квиноколом Плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Квиноколом Плюс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Квинокола Плюс - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата 3 года с даты производства.

10. Упаковка: полимерный флакон на 100 мл, укупоренный резиновой пробкой и обкатанный колпачком.