



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ЭНРОКОЛИ 10%

Рег.номер: 724-3-16.12-0789 №ПВИ-3-3.6/01867

Оральный раствор

2. Состав:

Энрофлоксацин 10 г

Колистина (сульфат) 100.000.000 МЕ

Наполнитель до 100 мл

3. Вид животного и показания к применению:

Энроколи 10% назначают с лечебной и лечебно-профилактической целью **бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку кур и индейке** при колибактериозе, хроническом респираторном заболевании (ХРЗ), микоплазмозе, гемофилезе, пастереллезе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе; **свиньям** при колибактериальной диарее и бактериальном энтерите.

4. Противопоказания:

Запрещается применять препарат курам-несушкам.

Не применять одновременно с нестероидными противовоспалительными продуктами.

Не следует применять Энроколи 10% животным с почечной или печеночной недостаточностью, новорожденным, а также животным, которые имеют индивидуальную чувствительность к колистину и энрофлоксацину.

5. Дозировка и способ введения:

Энроколи 10% применяют орально с водой для поения в следующих дозах:

Бройлеры, племенная птица, ремонтный молодняк кур и индейка: в суточной дозе 0,5 мл на 1 л питьевой воды в течение 3-5 дней; при сальмонеллезе, смешанных инфекциях, а также при хронических формах заболеваний – не менее 5 дней.



Свиньи: путем *индивидуального* выпаивания с водой один раз в сутки в течение 2-3 дней. Приготовить раствор из 0,3 мл Энроколи 10% на 1 кг массы животного в 2 мл питьевой воды. При тяжелой форме заболевания суточную дозу препарата увеличивают до 0,5 мл/ кг массы животного.

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление животными и сельскохозяйственной птицей в течение суток.

6. Период ожидания:

Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 14 дней, а птицы - 11 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, в том числе птицы, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Антагонистический эффект может появиться если использовать Энроколи 10% с хлорамфениколом, макролидами или тетрациклинами.

Одновременное введение субстанций, содержащих Mg^{+2} и/или алюминий могут снизить всасывание энрофлоксацина.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Энроколи 10% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Энроколи 10%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Энроколи 10% - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25° С - срок годности лекарственного препарата - 2 года с даты производства.

10. Упаковка: полиэтиленовые бутылки (1 литр) и канистры (5 литров) с навинчиваемыми пробками со стопором.

