



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60  
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

**1. Название:** ГИДРО КОЛИСТИН

Рег.номер: 724-3-16.12-0788№ПВИ-3-3.6/01866

Оральный раствор

**2. Состав:**

Колистина сульфат .....200 000 000 ЕД

Наполнитель ..... до 100 мл

**3. Вид животного и показания к применению:**

Гидро Колистин назначают для лечения и профилактики **свиньям и сельскохозяйственной птице** при желудочно-кишечных заболеваниях, вызываемых чувствительными к антибиотику микроорганизмами, особенно *E.coli.*, а также: *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomona aeruginosa* и *Klebsiella pneumoniae*.

**4. Противопоказания:**

Запрещается применять курам-несушкам.

Запрещается применять животным и птице с почечной недостаточностью.

**5. Дозировка и способ введения:**

Гидро Колистин применяют орально с водой для поения в следующих дозах:

**Птице:** 0,3-0,5 мл/л воды в течение 3-4 дней.

**Свиньи:** 1 мл на 10 кг массы животного в течение 3-4 дней.

В период лечения животные и птица должны получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление свиньями и птицей в течение суток.



## **6. Период ожидания:**

Убой свиней и птицы, на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

## **7. Предосторожности при применении препарата:**

Не следует применять Гидро Колистин с мышечными релаксантами (тубокуранин, панкурониум), в связи с тем, что усиливается нервно-мышечная блокада с последующим риском паралича дыхательных путей.

## **8. Меры личной профилактики.**

При работе с Гидро Колистином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гидро Колистином. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

**9. Условия и сроки хранения:** при соблюдении условий хранения Гидро Колистина - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25° С - срок годности лекарственного препарата - 2 года с даты производства.

**10. Упаковка:** полиэтиленовые бутылки (1 литр) и канистры (5 литров) с навинчиваемыми пробками со стопором.