



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ФЛОР-ФУД

Рег.номер: РК-ВП-4-3131-16

Микрогранулированный порошок для перорального применения

2. Состав:

Флорфеникол 10 г

Наполнитель до 100 г

3. Вид животного и показания к применению:

Флор-фуд применяется для лечения и профилактики респираторных и желудочно-кишечных заболеваний бактериальной этиологии у **свиней и сельскохозяйственной птицы**.

4. Противопоказания:

Не применять супоросным и лактирующим свиноматкам, а также животным и птице с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

5. Дозировка и способ введения:

Флор-фуд назначают **свиньям** в следующих дозах:

Профилактика и контроль илеита: 2 мг флорфеникола / кг ж.в., что эквивалентно 0,4 кг Флор-Фуд / тонна корма.

Лечение респираторных заболеваний: 10 мг флорфеникол / кг ж.в., что эквивалентно 2-2,5 кг Флор-фуда / тонну корма

Флор-фуд назначают **птице** в следующих дозах:

Лечение стафилококкоза, орнитоза, а также других инфекционных заболеваний **бактериальной этиологии**, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу и при вторичных бактериальных инфекциях: 20 мг флорфеникола / кг ж.в., что эквивалентно 4 кг Флор-фуда / тонну корма.



Доза Флор-фуда в корме должна учитывать живую массу животных и зависит от реального потребления корма животными. Для правильной дозировки флорфеникола рекомендуется пользоваться расчетом по следующей формуле:

$$\frac{x \text{ мг Флор – фуд.кг / день} \times \text{Примерный..живой..вес.(кг)}}{\text{Примерное потребление корма в..день.(кг / животное)}} = \text{мг Флор – фуд на кг корма}$$

В период лечения, свиньи и птица должны получать только корм, содержащий препарат. Флор-фуд вводят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств путем смешивания с зерновой частью, используя существующие технологии смешивания.

6. Период ожидания:

Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток, а птицы не ранее, чем через 6 суток после последнего применения лечебного препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Побочных явлений и осложнений при применении Флор-фуда, в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Флор-фудом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Флор-фудом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Флор-фуда - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности

лекарственного препарата составляет 3 года со дня производства. После первого вскрытия мешка лекарственный препарат можно использовать в течение 90 суток.

10. Упаковка: полиэтиленовые мешки, ламинированные алюминиевой фольгой, емкостью по 25 кг.

